

Příloha č.2 SOP 2

Posuzování způsobilosti dárců k odběru v souvislosti s infekcí COVID 19

- riziko přenosu infekce COVID 19 krevní transfuzí se dosud neprokázalo
- darovat krev je přes veškerá epidemiologická opatření žádoucí
- dárce krve jsou při odběrech chráněni a jednotlivá ZTS v souvislosti s pandemií COVID 19 zavedla řadu opatření s cílem zabránit přenosu infekce mezi dárce a personálem

- na našem oddělení je povinné nosit ochranné roušky a dodržovat odstupy 2 m mezi dárce
- po ukončení odběru se provádí důsledný úklid a desinfekce pracovních prostor

- dárce po prodělané infekci COVID 19 může krev darovat za 1 měsíc od ukončení izolace nebo karantény

- po aplikaci mRNA vakcín (Pfizer/BioNTech, Moderna) a proteinových vakcín (Novavax, Sanofi) odklad 14 dnů po každé vakcinační dávce, pokud se nevyskytnou další obtíže

- po aplikaci vektorových vakcín (AstraZeneca, Johnson & Johnson) odklad 28 dní po každé vakcinační dávce (nelze vyloučit změnu stanoviska)

- pokud dárce dostane infekci COVID 19 do 1 týdne od odběru, musí informaci předat na Transfúzní oddělení a toto pak zajistí tzv. klinický lookback, tzn. informovat zpracovatele, aby odebranou plnou krev zlikvidoval

- dárce nemůže darovat krev, pokud byl dárce v posledních 14 dnech v kontaktu s COVID 19 pozitivní osobou

16.12.2021

MUDr. Dagmar Adamová
primářka úseku hematologie a TS, kvalifikovaná osoba